

LÉGENDE



Masque en tissu  
fait maison



Protection oculaire  
simple



Masque chirurgical IIR



Lunettes  
à protections latérales



Masque respiratoire FFP2



Visière  
si soin invasif



Blouse d'isolement  
manches longues  
à usage unique



Coiffe ou cagoule  
chirurgicale



Tablier en plastique  
si risque de projections



Gants non stériles  
à usage unique



Combinaison imperméable  
jetable, type « Tyvec »



Gants non stériles  
réutilisables



Risque de projections



Hygiène des mains



Soin aérosolisant



Proches du patient  
dans pièce à part




Protection individuelle  
en fonction des pathologies



**Séparation spatiale et organisationnelle** des patients COVID-19 des autres patients.  
**Si patient COVID positif, lui mettre un masque en salle d'attente** sauf situation de capacité B et C, voir recommandations masques supra.



**Avant le début du traitement** il est recommandé de **rincer la bouche avec une solution de peroxyde d'hydrogène à une concentration de 1%** (le virus est vulnérable à l'oxydation). **Attention :** la Chlorhexidine 0,2% ne détruit pas de manière efficace le virus SARS-CoV-2.



**L'utilisation d'une digue dentaire (Kofferdam) est vivement recommandée.**

	CAPACITÉS OPTIMALES	CAPACITÉS EN TENSION	CAPACITÉS DE CRISE
Patients COVID-19 confirmés ou suspects pour soins dentaires			
Prise en charge de patients non suspectés COVID-19			